

โรคพิษสุนัขบ้า

อาการที่พบในคน

โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส์ เชื้อจะอยู่ในน้ำลายสัตว์ พบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม คนและสัตว์สามารถรับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ เมื่อถูกสัตว์ที่เป็นโรคนี้กัดหรือข่วน

พบมากที่สุดใน

สุนัข



แมว



วัว



ส่วนใหญ่ระยะฟักตัวของโรค ตั้งแต่ 3 สัปดาห์ ถึง 6 เดือน แต่บางรายมีระยะฟักตัวสั้นมากไม่ถึงสัปดาห์หรืออาจเกิน 1 ปี **อาการเริ่มแรก** คือ เบื่ออาหาร เจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย มีอาการคันรุนแรงบริเวณที่ถูกกัด แล้วลามไปส่วนอื่น กระสับกระส่าย กลัวแสง กลัวคน กลืนลำบาก โดยเฉพาะของเหลว กลั้วน้ำ เพื่อเจ้อ ปวดท้องน้อยและขา กล้ามเนื้อกระตุก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก เกร็ง อัมพาต หมดสติ และตายในที่สุด

เมื่อถูกสุนัขหรือแมว กัด ข่วน **ต้องรีบ**



ล้างแผล
ด้วยสบู่และน้ำสะอาด
อย่างเบาๆ หลายๆครั้ง

ใส่ยา รักษาแผลสด



กักหมาหรือสัตว์ที่ กัดไว้ ดูอาการ 10 วันและ
สืบทามประวัติการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

หาหมอ

เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฯ
ที่ถูกต้อง และมาตามนัด
ทุกครั้ง



คาถา 5 ย กันสุนัขกัด

ติดต่อเรา



ย 1 อย่าแหย่
สุนัข ให้โมโห



ย 2 อย่าเหยียบ
หาง หวี ขา หรือทำให้
สุนัขตกใจ




ย 3 อย่าแยก
สุนัขที่กำลังกัดกัน
ด้วยมือเปล่า



ย 4 อย่าหยิบ จานข้าวหรือ
เคลื่อนย้ายอาหารขณะที่
สุนัขกำลังกินอาหาร



ย 5 อย่างง หรือเข้าใกล้สุนัข
ที่ไม่รู้จักและไม่มีเจ้าของ



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
447 ถนน เชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต
อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

 053 140 774 - 6

 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่



ที่มา : แผนพับโรคพิษสุนัขบ้า
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

โรคพิษสุนัขบ้า



รอบรู้ หลีกเสี่ยง ไม่เสี่ยงโรค